

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



LORRAINE

GRANDES CULTURES

Bulletin n° 4 du 14 mars 1996

Colza

Charançon de la tige

Malgré les températures froides, les premiers charançons de la tige sont apparus dans les secteurs de Verdun (55) et de Dompierre (88).

Le froid limite leur activité et les traitements pourraient intervenir dans les secteurs les plus précoces (vallées, ouest meusien, région de Dompierre) en fin de semaine ou début de semaine prochaine, surtout si les températures s'élevaient dans la journée.

Dans les autres secteurs, on peut encore attendre quelques jours. Si vous avez placé une cuvette jaune dans votre parcelle, traiter 8 à 10 jours après les premières captures du charançon.

Céréales

Toutes les contaminations provoquées par des champignons sont actuellement bloquées, y compris pour le piétin verse. Les premiers symptômes de cette maladie n'apparaîtront sans doute pas avant le stade 1 noeud et la décision de tout traitement spécifique ne devra pas intervenir avant cette période.

Sur orge d'hiver, variétés sensibles, plusieurs cas de mosaïques ont été identifiés. Nous rappelons que seul le choix d'une variété résistante permet d'éviter cette maladie, toute la Lorraine étant contaminée par le virus. Attention, les nombreux jaunissements observés actuellement ont d'autres origines (voir notre dernier bulletin).



Colza : Sortie des premiers charançons.



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51

ABONNEMENT ANNUEL

350 F